

人工股関節置換術を受けられる

様へ

主治医

看護師

あなたの手術は、 月 日 PMより(全身麻酔・腰椎麻酔)にて行われます。

経過 月日	入院～前日まで	手術前日	手術前	手術後	術後1日目	術後2～5日目	術後6～14日目	術後14日～3週間	退院許可～退院
検査				手術後に血液検査をします。	朝食前に血液検査をします。	術後4日目の朝食前に血液検査をします。	術後7日目、14日目の朝食前に血液検査、昼食後にレントゲン検査をします。	術後21日目の朝食前に血液検査をします。	
処置			朝、排便なければ浣腸します。 血栓予防の靴下をはきます。 手術室に行く前に、入れ歯やアクセサリなど、はずせるものははずしてください。 10時、手術室入室前に体温、脈、血圧を測ります。 血液型バンドをつけます。点滴前に手術着に着替えます。	手術後は術後回復室に入ります。 時間毎に体温、脈、血圧を測定します。 フットポンプをつけます。  指示により、酸素吸入、心電図モニターを付けます。 痛みの強いときには痛み止めを使うことができます。 創部に血抜き管が入ります。 脱臼予防のために外転枕を足に装着します。(足を組んだりできません) 痛み止めのチューブが腰の所から入ってきます。	問題がなければ、酸素吸入、心電図モニター、フットポンプをはずします。 回診時に創の確認を行います。 回診後、術後回復室から自室へもどります。	ガーゼ交換があります。 創部の管を抜きます。 尿管を抜きます。 背中の痛み止めの管を抜きます。 	術後10～14日ごろ、抜糸します。 術後7日目頃、血栓予防の靴下を外します。 	外転枕をはずします。	
注射・点滴			手術前より翌朝まで点滴を行います。  抗生物質の点滴が1日2本(朝、夕)あります。 						 分からない事がありましたらお尋ね下さい。
内服薬	内服している方は一度全て担当看護師に預けて下さい。 		朝、指定された薬のみ少量の水で内服します。				血栓予防のための内服があります。		
食事	制限はありません。	夕食までは食べられます。21時以降は食べたり、飲んだり出来ません。	食べたり飲んだりできません。 		朝より開始します。 				
安静・リハビリ	リハビリを開始します。			ベッド上で安静にしてください。 	車椅子に乗ることができます(必ず介助でおこないます) リハビリを開始します。 リハビリ状況に応じて、補助具での歩行が可能になります) 	器械(CPM)で膝曲げの訓練をします(120°まで曲がれば終了です)		試験外泊ができます。	
清潔		シャワーに入ります。 			体を拭いて着替えをします。 	傷口がガーゼでなく透明なシートになったらシャワーに入れます。 		退院おめでとうございます。お大事に!!  	
説明		麻酔科医の診察があります。 	ご家族の方は手術中は院内で待機して、所在がわかるようにして下さい。 	手術結果について説明があります。 					

※この表は治療のおおよその経過をお知らせするものです。状況に応じて予定が変更になる場合があります。