

あなたの手術は、月 日 PMより(全身麻酔 ・ 腰椎麻酔)にて行われます。

経過 月日	入院～前日まで	手術前日	手術前	手術後	術後1日目	術後2～5日目	術後5～14日目	術後14日～3週間	退院許可～退院
検査	入院時、血液検査・心電図 レントゲン検査があります。			手術後に血液検査をします。	朝食前に血液検査をします。	術後4日目の朝食前に 血液検査をします。	術後7日目の朝食前に 血液検査、昼食後に レントゲン検査をします。	術後14日目、21日目 の朝食前に血液検査、 昼食後にレントゲン検査 をします。	
処置	血栓予防の 靴下をはきます。 尿の管が入ります。  医師の指示により、 骨折してる足の牽引を 開始します。	午前中浣腸をかけます。 爪を切ります。 	手術室に行く前に、 入れ歯やアクセサリーなど、 はずせるものは はずしてください。 10時、手術室入室前に 体温、脈、血圧を測ります。 血液型バンドをつけます。 点滴前に手術着に着替え ます。	手術後は術後回復室に入ります。 時間毎に体温、脈、血圧を 測定します。 フットポンプをつけます。 指示により、酸素吸入、 心電図モニターを付けます。 痛みの強いときには痛み止めを 使うことができます。 創部に管が入ります。   	問題がなければ、 酸素吸入、心電図モニター、 フットポンプをはずします。 回診時に創の確認を行います。 回診後、術後回復室から 自室へもどります。 	ガーゼ交換があります。 創部の管を抜きます。 尿の管を抜きます。 	術後10～14日ころ 抜糸します。 術後7日目ころ、 血栓防止ストッキングを 外します。 		
注射・点滴			手術前より翌朝まで 点滴を行います。 	抗生物質の点滴が1日2本(朝、夕)あります。 				分らない事がありましたら お尋ね下さい。 	
内服薬	内服している方は 一度全て担当看護師に 預けて下さい。 排便をコントロールする 内服を飲みます。 		朝、指定された薬のみ 少量の水で内服します。			血栓予防のための 内服があります。			
食事	制限はありません。 	夕食までは食べられます。 21時以降は食べたり、 飲んだり出来ません。	食べたり飲んだりできません。  		朝食より開始します。  				
安静・ リハビリ	ベッド上で安静にして下さ い。 リハビリを開始します。			ベッド上で安静にして下さい。 	車椅子に乗ることができます。 (必ず介助でおこないます) リハビリを再開します。 リハビリ状況に応じて補助具での歩行が可能となります。 機械(CPM)で膝曲げの訓練をします (120° まで曲がれば終了です)			試験外泊ができます。	
清潔		体を拭きます。			体を拭いて着替えをします。 	傷口がガーゼでなく 透明なシートになったら シャワーに入れます。 			
説明	外来で手術について説明を 受けられていない方は、 手術の説明があります。 手術に必要な物品を 説明させていただきます。 医療相談員の 訪問があります。 	麻酔科医の 診察があります。 	手術中、ご家族の方は 病棟で待機して 所在が わかるようにして下さい。 	手術結果について 説明があります。 				退院おめでとう ございます。 お大事に!!  	