


大腸ポリープ切除術を受けられる

様へ

担当医

経過 月日	手術当日(前)	手術当日(後)	手術後1日目	手術後2日目～			
検査	検査に行く前に入れ歯や アクセサリなど、外せるものは 全て外して下さい。 内視鏡室から呼ばれるまで病室でお待ち下さい。 		腹部レントゲンの 検査があります。 8時30分頃レントゲン室へ 行きます。 				
処置	便の状態により、浣腸をすることがあります。 検査着に着替えます。 ネームバンド装着します。 						
注射・点滴	点滴を始めます。 						
内服薬	朝5時より下剤1800mlを 2時間かけて飲んでください。 (約200mlを10分～15分かけて 飲むペースです) 普段降圧剤を内服されている方は 朝6時に飲んでください。 	医師の指示により 夕方より内服薬(持参薬)開始となります。 					
食事	水分は飲んで大丈夫です。 (水、お茶、スポーツ飲料) 	手術直後より水分は飲んで大丈夫です。 (水、お茶、スポーツ飲料) 	症状がなければ 朝食(5分粥)が出ます。 				
安静	手術までは自由です。 	隣のクリニックの内視鏡室で行います。 検査へは歩いて行きますが、 帰りは車イスで帰室します。 その後2時間は トイレのみの歩行となります。 2時間後からは自由です。 	午前中退院となります。 				
清潔	入浴できません。		退院後は入浴できます。				




<患者様へ>
【手術前】
・便が出るたびに便の性状を確認して下さい。
黄色透明になれば検査可能です。
【手術後】
・腹痛や便に血が混じっていたらお知らせ下さい。
・何かありましたら、がまんせずに
ナースコールでお知らせ下さい。
・ポリープの大きさや数によっては
入院が一日のび、食事も一日ずれます。
・次回外来日をお知らせします。




<退院について>
午前中の回診後、退院となります。

<退院後の注意事項>

- ・手術後1週間は、激しい運動や、重い荷物を持つたり、腹部に力を入れるような仕事、ハードスケジュール(旅行)はさけましょう。消化のよいものを食べてください。(退院してから2～3日はお粥など消化の良いものを食べて下さい。)
- ・退院後1週間は、刺激物をさげ、アルコールは飲まないようにしてください。
- ・1週間は便をかまず、自然に出すようにしてください。
- ・入院中のみでなく、退院後も腹痛や便に血が混じるなどの症状があれば、早めに病院に連絡をするか外来にいらしてください。
- ・必ず指示された日に外来受診してください。
- ・普段抗凝固剤(血液を固まりにくくする薬)を内服されている方は、手術後7日目より内服を再開してください。



退院おめでとう
ございます。
お大事に!!





分からない事がありましたら
お尋ね下さい。

