消化器

【mFOLFOX6療法】
アイソボリン　200mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
オキサリプラチン　85mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
フルオロウラシル　400mg/㎡　5分かけて急速静注　day1
フルオロウラシル　2400mg/㎡　46時間かけて持続静注　day1-2
2週ごと

【FOLFIRI療法】
アイソボリン　200mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
イリノテカン　150mg/㎡　90分で点滴静注　day1
フルオロウラシル　400mg/㎡　5分かけて急速静注　day1
フルオロウラシル　2400mg/㎡　46時間かけて持続静注　day1-2
2週ごと

【CapeOX療法】
オキサリプラチン　130mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
カペシタビン　2000mg/㎡/日 分2　経口　day1-14
3週ごと

【SOX療法】
オキサリプラチン　130mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
S-1　80mg/㎡/日　分2　経口　day1-14
3週ごと

【IRIS（S-1+IRI）療法】
イリノテカン　150mg/㎡　90分で点滴静注　day1
S-1　80mg/㎡/日　分2　経口　day1-14
3週ごと

【5-FU＋l-LV療法】
レボホリナート　250mg/㎡　2時間で点滴静注　day1,8,15…
フルオロウラシル　600mg/㎡　開始1時間後に5分かけて急速静注　day1,8,15…
6週投与2週休薬（もしくは3週投与1週休薬）

【mFOLFOX6＋ベバシズマブ療法】
ベバシズマブ　5mg/kg　30～90分で点滴静注　day1
アイソボリン　200mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
オキサリプラチン　85mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
フルオロウラシル　400mg/㎡　5分かけて急速静注　day1
フルオロウラシル　2400mg/㎡　46時間かけて持続静注　day1-2
2週ごと

【FOLFIRI＋ベバシズマブ療法】
ベバシズマブ　5mg/kg　30～90分で点滴静注　day1
アイソボリン　200mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
イリノテカン　150mg/㎡　90分で点滴静注　day1
フルオロウラシル　400mg/㎡　5分かけて急速静注　day1
フルオロウラシル　2400mg/㎡　46時間かけて持続静注　day1-2
2週ごと

【CapeOX＋ベバシズマブ療法】
ベバシズマブ　7.5mg/kg　30～90分で点滴静注　day1
オキサリプラチン　130mg/㎡　2時間で点滴静注day1
カペシタビン　2000mg/㎡/日 分2　経口　day1-14
3週ごと

【FOLFIRI＋ラムシルマブ療法】
ラムシルマブ　8mg/kg　1時間で点滴静注　day1
アイソボリン　200mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
イリノテカン　150mg/㎡　90分で点滴静注　day1
フルオロウラシル　400mg/㎡　5分かけて急速静注　day1
フルオロウラシル　2400mg/㎡　46時間かけて持続静注　day1-2
2週ごと

【mFOLFOX6＋パニツムマブ療法】
パニツムマブ　6mg/kg　1時間で点滴静注　day1
アイソボリン　200mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
オキサリプラチン　85mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
フルオロウラシル　400mg/㎡　5分かけて急速静注　day1
フルオロウラシル　2400mg/㎡　46時間かけて持続静注　day1-2
2週ごと

【FOLFIRI＋パニツムマブ療法】
パニツムマブ　6mg/kg　1時間で点滴静注　day1
アイソボリン　200mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
イリノテカン　150mg/㎡　90分で点滴静注　day1
フルオロウラシル　400mg/㎡　5分かけて急速静注　day1
フルオロウラシル　2400mg/㎡　46時間かけて持続静注　day1-2
2週ごと

【イリノテカン＋パニツムマブ療法】
パニツムマブ　6mg/kg　1時間で点滴静注　day1
イリノテカン　150mg/㎡　90分で点滴静注　day1
2週ごと

【FTD/TPI＋ベバシズマブ療法】
ベバシズマブ　5mg/kg　30～90分で点滴静注day1,15
トリフルリジン・チピラシル　70mg/㎡/日　分2　経口　day1-5,day8-12
4週ごと

【S-1＋ベバシズマブ療法】
ベバシズマブ　7.5mg/kg　　30～90分で点滴静注day1
S-1　80mg/㎡/日　分2　経口　day1-14
3週毎

【カペシタビン＋ベバシズマブ療法】
ベバシズマブ　7.5mg/kg　　30～90分で点滴静注day1
カペシタビン　2000mg/㎡/日　分2　day1-14
3週毎

【S-1＋シスプラチン療法】
S-1　80mg/㎡/日　分2　経口　day1-21
シスプラチン　60mg/㎡　2時間で点滴静注　day8
5週ごと

【カペシタビン＋シスプラチン療法】
カペシタビン　2000mg/㎡/日　分2　day1-14
シスプラチン　80mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
3週ごと

【カペシタビン＋シスプラチン＋トラスツズマブ療法】
カペシタビン　2000mg/㎡/日　分2　day1-14
シスプラチン　80mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
トラスツズマブ　初回投与時 8mg/kg　90分以上で点滴静注
　　2回目以降 6mg/kg　30分以上で点滴静注　day1
3週ごと

【SOX療法】
S-1　80mg/㎡/日　分2　経口　day1-14
オキサリプラチン　100mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
3週ごと

【CapeOX療法】
カペシタビン　2000mg/㎡/日　分2　day1-14
オキサリプラチン　130mg/㎡　2時間で点滴静注　day1
3週ごと

【パクリタキセル＋ラムシルマブ療法】
パクリタキセル　80mg/㎡　1時間で点滴静注　day1,8,15
ラムシルマブ　8mg/kg　1時間で点滴静注　day1,15
4週ごと

【イリノテカン療法】
イリノテカン　150mg/㎡　90分で点滴静注　day1
2週ごと

【パクリタキセル療法】
パクリタキセル　80mg/㎡　1時間で点滴静注　day1,8,15
4週ごと

【ドセタキセル療法】
ドセタキセル　75mg/㎡　1時間で点滴静注　day1
3週ごと

【ニボルマブ療法】
ニボルマブ　240mg　30分で点滴静注　day1
2週ごと